

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str.Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244

e-mail :ofgalati@anfof.ro**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr.12 din 10.04.2023



Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului **MOLIA CRUCIFERELOR**

MOLIA CRUCIFERELOR (*Plutella xylostella*) **GARGARITA TULPINILOR DE RAPITA** (*Ceutorhynchus napi*), **GANDACUL LUCIOS AL RAPITEI** (*Meligetes aeneus*) **PURICII CRUCIFERELOR** (*Phyllotreta spp.*), **AFIDE** (*Aphis spp*)


Care pot cauza pierderi importante la culturile: **RAPITA**

Pentru prevenire și combatere se recomanda executarea tratamentului; 4

MOLIA CRUCIFERELOR (*Plutella xylostella*) este considerate un dăunător important al cruciferelor cultivate, mai ales la varză, conopidă, rapiță, muștar etc. Începând cu 2020, molia și-a făcut simțită prezența și în lanurile de rapiță

Adultul este un fluture mic, cu anvergura aripilor de 12-15 mm, culoarea corpului este brun -cenusie, Molia cruciferelor iernează în stadiul de pupă, într-un cocon matasos, fixat pe frunzele atacate. În condițiile noastre, specia prezintă trei generații pe an, prima se dezvoltă în perioada mai-iulie, cea de-a două în perioada iulie-august în timp ce generația a treia se dezvoltă din luna august până în luna mai, anul următor (aceasta poate pune probleme în toamna culturii rapitei). Modificările climatice recente sugerează că în cazul uneor toamne calde și lungi, acest daunător dezvoltă 4-5 generații/an.

Plutella xylostella (Molia cruciferelor)



Ciclul de viață are patru etape sau stadii: adult, ou, larvă, pupă. Durata fiecărui stadiu este condiționată de condițiile climatice (temperatura mai ales). Adulții sunt mici (cam 9 mm lungime) și au culoare predominant maro - cenușiu către ocru. Aripile au culoare variabilă de la ocru la maro, cu pete negre. Când sunt pliate, în partea superioară formează trei sau patru zone în formă de diamant de culoare alb - cenușiu.

Chiar dacă acest dăunător este considerat secundar la rapiță, în anii favorabili poate produce daune semnificative.


Prezența dăunătorului molia verzei – *Plutella xylostella*, forma larvară și modul de hrănire minier în culturile de rapiță reprezintă o amenințare severă din punct de vedere cultural și economic pentru această cultură.

Intervențiile uzuale cu substanțele active acetamiprid și alți pirotroizi de contact nu controlează în totalitate formele larvare a dăunătorului. În lanurile de rapiță controlate unde molia a depășit pragul economic de dăunare PED 2-3 larve/planta, este necesara aplicarea tratamentelor

In acest sens MADR ,in conformitate cu prevederile art.53 al Regulamentului (CE)1107/2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului deliberand asupra solicitarii nr.3949/23.03.2023 ,a Asociatiei Producatorilor de Porumb din Romania(APPR), DA APROBARE “ in perioada 29 martie-26 iulie2023” a utilizarii produsului de protectie a plantelor EXIREL(100g/L ciantraniliprol)pentru combaterea organismelor daunatoare *Plutella xylostella*,*Ceuthorrhynchus napi*,*Meligetes aeneus*,*Aphis spp.* In culturile de rapita.

Autorizatie pentru utilizarea in situatie de urgență a produsului de protectie a plantelorEXIREL

2.Gărgărița tulpinilor de rapiță – Ceuthorrhynchus napi



Gărgărița tulpinilor iernează ca insectă adultă în stratul superficial al solului în jurul plantelor.

La temperatura aerului de peste 9°C primii adulți de *Ceuthorrhynchus* încep să își facă apariția. Acest lucru se întâmplă destul de devreme, în luna februarie sau martie. Zborul intens are loc atunci când temperatura aerului depășește 12°C. **Mod de dăunare:** La început, adulții provoacă mici rostături pe frunze, peștiol și chiar pe tulipa floriferă, fără să provoace pagube semnificative, atacul, în această fază, poate trece neobservat. Pagubele mari le produc larvele care rod galerii în interiorul tulpinilor determinând deformarea și răsucirea acestora. Plantele atacate ramifică abundant, stagnează în creștere, nu formează silicve, sau acestea sunt seci. Gradul de dăunare variază între 50 – 100%.

Pentru prevenire și combatere se recomanda executarea tratamentului; 2

Numai unde s-au realizat urmatoarele condiții;

- temperaturi mai mari de 9 °C
- PED -2-3 larve/planta pentru molie

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos după caz:

EXIREL:0,5 litri/ha pentru- *Plutella xylostella*

- *Ceuthorrhynchus napi*,
- *Meligetes aeneus*

EXIREL :0,75 litri/ha pentru -*Aphis spp*

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE PE TERITORIUL ROMANIEI

Masuri alternative de combatere : masuri de igiena culturala,lucrari minime ale solului imediat dup arecoltarea culturii premergatoare ;pregatirea unui pat germinativ bun avand in vedere dimensiunile mici ale sesemintei si necesitatea punerii acestiei in contact cu solul.

Metode durabile : biologice,fizice,mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura control corespunzator organismelor daunatoare.

Perioada optima de tratament; cand se realizeaza conditiile de mai sus.

Alte recomandari : Tratamentul se efectuează la avertizare, pot fi combătuți doar adulții, nu există insecticid omologat pentru combaterea larvelor și a ouălor de *Ceutorrhynchus napi*. Perioada de maximă sensibilitate pentru cultură este înainte ca rapița să ajungă la 20 cm înălțime. Odată pătrunse în tulipină, combaterea gărgărițelor este aproape imposibilă.

Tratamentul se va efectua pe timp liniștit fără precipitații.

!Producatorii agricoli să controleze cultura de rapita și să efectueze tratament împotriva Gărgăriței tulpinilor de rapiță înainte de depunerea maxima a pontelor Pentru o combatere eficientă nu trebuie să se astepte atingerea pragului economic(PED) de daunare de 1-2 adulți pe plantă.

ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR",ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.
Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani. Aceasta cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sanctionează cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Citiți cu mare atenție instrucțiunile de pe eticheta produsului de protecție a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii.

Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.127/1991 al ACA din România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS privind implementarea legislației. Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitară Veterinare și pentru Singuranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

Responsabil Prognoza și Avertizare,

Ing .Huci Maria-Angela