



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.45.din 23.07.2026


Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii:

Rapănul(*Venturia inequalis*), Făinarea (*Podosphaera leucotricha*),*Monilioza* (*Monilinia fructigena*) + *Păduchele lănos*(*Eriosoma lanigerum*),

Păduchele din san Jose(G1), Viermele merelor(G2) (*Cydia pomonella*), Acarieni, Insecte minatoare, alți dăunători.

Care pot cauza pierderi importante la culturile: MĂR, PĂR, GUTUI

Rapănul(*Venturia inaequalis*)



Rapănul(*Venturia inequalis*):boala se datorează atacului ciupercii *Venturia inequalis*. Patogenul atacă organele verzi ale plantei:frunze,flori,fructe, lăstari. Atacul apare sub forma unor pete cenușii care treptat vor ajunge la culoare brună(cu aspect catifelat). Frunzele puternic atacate cad conducând la defolierea pomului. Defolierea prematură influențează negativ fructificarea, dar poate influența și maturarea lemnului (o maturare deficitara a lemnului scade rezistența la îngheț, nu permite diferențierea optimă a mugurilor de rod).

Făinarea (*Podosphaera leucotricha*)

Făinarea este produsă de ciuperca numită *Podosphaera leucotricha*,ciuperca iernează în principal sub formă de miceliu de rezistență între solzii mugurilor și pe lăstarii atacați. Primăvara devreme, la suprafața organelor atacate se formează conidiile ciupercii, care, în condiții favorabile, realizează noi infecții. Făinarea atacă în special frunzele pomilor și lăstarii tineri, însă pot fi afectate și florile sau fructele tinere. Organele atacate se acoperă cu o pulbere albicioasă, care își schimbă treptat culoarea în gălbui și poate fi observată cu ușurință. Această pulbere reprezintă miceliul ciupercii, prin care patogenul se poate răspândi rapid.Frunzele acoperite de făinare își îndoaie apoi vârfurile și marginile înspre partea superioară și se usucă timpuriu. Lăstarii atacați pot căpăta o culoare

maronie, în timp ce vârfurile lor se îndoaie precum un cârlig.

Fainarea (*Podosphaera leucotricha*)



Monilioza la măr

Monilioza la măr are un caracter epidemic, așa că trebuie tratată încă din primă fază, pentru a evita răspândirea ei și contaminarea tuturor pomilor din livadă. Aceasta apare în special în primăverile ploioase și atacă frunzele, florile și lăstarii, care se brunifică. Frecvent întâlnită la măr și păr, monilioza infectează pomii producând daune spre maturitatea fructelor.

Ciuperca care parazitează fructele în timpul recoltării se manifestă ulterior și în lădițele depozitate. Boala afectează ramurile, florile și fructele.



Pentru combaterea bolilor de depozitare la meri și peri, se poate aplica tratament cu fungicide omologate în acest sens.. Aplicat cu șapte zile înainte de recoltare, tratamentul pentru monilioză la măr reduce semnificativ pierderile cauzate de bolile de depozitare (*Gloeosporium* spp. – putregaiul amar, *Penicillium* spp. – putrezirea umedă, *Botrytis* spp. – putregaiul cenușiu, *Alternaria* - putrezirea amară).

Viermele merelor(*Cydia pomonella*):



Larvele de viermele merelor ataca fructele de mar,par,gutui,producand pagube importante in livezi. Fluturile de *Cydia pomonella* –femela, își depune ouale direct pe fruct sau în imediata apropiere a acestuia, pe partea inferioară sau superioară a frunzei. Larvele generației I(G1)pătrund în interiorul fructelor, consumă semințele și trec la alt fruct(o larva poate ataca până la 6 fructe). Fructele atacate rămân mici și cad pe sol. Larvele generației a IIa (G2){20 iulie-15 august}ataca fructele pârguite sau coapte. Fructele mature atacate putrezesc ușor și au o valoare comercială redusă.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 6 , 7

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

Rapăn-frunze grad de atac peste 10%:făinare- frunze grad de atac peste 10%:San Jose-prezența dăunătorului (larve)în livadă, pomi cu atac peste 3%: viermele merelor-prezența dăunătorului:acarieni-3-5 forme mobile pe frunză.

Folosiți unul din produsele de mai jos după caz:

1. CAPTAN 80WDG/CAPTADIN:2,250kg/ha + SULPHUR 80WG:4,5 kg/ha + DELTAGRI/FASTER DELTA :0.25-0,45 litri/ha sau
- 2.CHAMP77WG/ COPPERMAX: 2,0 kg/ha + AFFIRM: 3,0-4,0 kg/ha sau
3. ORIUS 25EW/SALVATOR 25EW; 0,75litri.ha + KARATE ZEON/ NINJA : 0,225 litri/ha sau
4. MOLINA: 0,4 litri/ha + HARPUN : 1,0 litri/ha sau
- 5.THIOVIT JET 80WG: 5,0-8,0kg/ha + JACKPOT 2,5EC/ DELTASAP 2,5 EC: 1,0 litri/ha sau

Alte produse de protecție a plantelor omologate pe teritoriul României .

Măsuri alternative de combatere : biologice, fizice, mecanice.

Metode durabile : biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură control corespunzător organismelor dăunătoare.

Perioada optimă de tratament; când se realizează condițiile de mai sus

Alte recomandari : Tratamentul se va repeta după 8-10 zile,se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C.Se va respecta timpul de pauză de la tratament până la consum, pentru soiurile de vară, specificat pe eticheta produselor de protecție a plantelor utilizate.

Regulă - Nu se fac două tratamente la rând cu aceleași produse de protecția plantelor.

Atenție! Respectați condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole conform-Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecție a plantelor, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară. Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani. Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 7 SI 8). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Citiți cu mare atenție instrucțiunile de pe eticheta produsului de protecție a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător! Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii. Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.127/1991 al ACA din România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS privind implementarea legislației. Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. **Buletinele de avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a putea fi accesibile tuturor celor interesați.**

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Daniela Viorica Vilcu

