

**BULETIN DE
AVERTIZARE**

Nr.51 din 07.08.2026



Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii:

Mana castraveților (Pseudoperonospora cubensis), Făinare (Podosphaera fuliginea), Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) + Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum), Afide, Acarieni, alți dăunători

Care pot cauza pierderi importante la culturile: **CASTRAVEȚI** (Ciclul II de producție – spații protejate)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: 3, 4

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

Mană; frunze- grad de atac 10%; făinare- frunze- grad de atac peste 10%; putregai cenușiu- fructe atacate peste 3%; păduche, trips, păianjen- frunze atacate peste 15%.

Folosii unul din produsele sau din amestecurile de mai jos după caz:

1. VENUS 250SC/FRIGGA 250EC : 0,75-1,0 litri/ha + MAVRIK 2F/EVURE : 0,2 litri /ha sau
2. ROUBAIX/ZINGARO : 0,75-1,0 L/ha + POLECI/DECA 2,5 EC : 0,3-0,5 litri/ha (0,03-0,05%) sau
3. AZUBA 250SC/AZOXIPRO 250SC: 0,75-1,0 L/ha + AZATIN EC : 1,0-1,5 kg/ha sau
4. ALCUPRAL 50PU : 1,5-2,0 kg/ha + BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF : 0,5-1,0 kg/ha sau
5. VITRA 50WP/CUPRIDIN : 1,5-2,0 kg/ha + ORTUS 5 SC : 1,0 litri/ha sau

Alte produse de protecție a plantelor omologate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere: monitorizarea culturii prin instalarea capcanelor care au rol de a pune în evidență prezenta dăunătorilor dar și de colectare a indivizilor ; asigurarea etanșietății spațiilor protejate și utilizarea plaselor de insecte ; smulgerea și distrugerea prin ardere a plantelor suspecte a fi infestate/infectate.

Metode durabile : biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură control corespunzător organismelor dăunătoare.

Perioada optimă de tratament: când se realizează condițiile de mai sus.

Alte recomandări : Monitorizarea culturii de castraveți prin instalarea capcanelor care au rol de a pune în evidență prezenta dăunătorilor dar și colectarea indivizilor.

Asigurarea etanșietății spațiilor protejate prin utilizarea plaselor de insecte. Se va evita excesul de umiditate și se va asigura o bună aerisire.

Tratamentul se va repeta după 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C. Se va respecta timpul de pauză de la tratament până la consum, specificat pe eticheta produselor de protecție a plantelor utilizate

Regulă - Nu se fac două tratamente la rând cu aceleași produse de protecția plantelor.

Atenție! Respectați condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă conform Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecție a plantelor, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară. Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în **Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani**. Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 7 SI 8). **Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.**

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Citiți cu mare atenție instrucțiunile de pe eticheta produsului de protecție a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător! Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii. Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.127/1991 al ACA din România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS privind implementarea legislației. Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Buletinele de avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a putea fi accesibile tuturor celor interesați .

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Daniela Viorica Vilcu